286 Abubilla





Abubilla. Adulto. Macho (27-V).

ABUBILLA (*Upupa epops*)

IDENTIFICACIÓN

25-28 cm. Dorso pardo, con franjas transversales blancas y negras; pecho rosado-vinoso, con partes inferiores blancas; cabeza de color leonado con una cresta rosada con punta negra y blanca; alas y cola negras con franjas blancas; pico largo y curvado hacia abajo.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

Juveniles similares a una hembra, pero con plumas de vuelo nuevas y sin trazas de muda; la pluma más externa de la cola con punta redondeada; punta de la novena primaria afilada. 2º año con las plumas de vuelo muy desgastadas; si no han mudado la cola está desgastada y de punta redondeada.

Adultos con tinte vinoso en las plumas del pecho; la pluma más externa de la cola con punta cuadrada; punta de la novena primaria ancha y redondeada.

CUIDADO: algunos autores describen la pluma más externa de la cola con la mancha negra del ápice con bordes bien definidos en el **adulto** y bordes difusos en el **juvenil/2º año**, pero las excepciones son tan numerosas que no es un carácter siempre válido.

SEXO

El macho se reconoce por su garganta y pecho de color vinoso intenso; manto sin tinte rosado. La hembra con garganta y pecho menos vinosos; manto con tinte rosado; lados del vientre y pecho más estriados que en el macho. Algunos juveniles extremos pueden sexarse: macho con cabeza y pecho más vináceo-rosa que la hembra. CUIDADO: con plumaje algo desgastado estas diferencias en el tono del plumaje son difíciles de ver y en muchos casos no es posible sexar los ejemplares a no ser que la pareja esté junta.

MUDA

Muda postnupcial completa; plumas del cuerpo y a veces alguna pluma de vuelo y cola mudadas en sus áreas de cría entre julio-agosto; terminada después en sus áreas de invernada africana. La muda postjuvenil es parcial e incluye sólo las plumas corporales, extendiéndose en algunos ejemplares a la cola y terciarias; las aves que han nacido pronto pueden comenzarla en sus zonas de cría siendo lo normal que muden en sus áreas de invernada. Existe una pequeña muda prenupcial que incluye las plumas de la cabeza y cuello en ejemplares adultos y en algunos juveniles.

FENOLOGÍA



ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, con algunos ejemplares sueltos invernantes, repartida de forma generalizada por toda la Comunidad excepto en algunas zonas del norte.



Abubilla. Adulto. Hembra (18-VII).

286 Abubilla





Abubilla. Juvenil. Macho (04-VIII).



Abubilla. Juvenil. Hembra (26-VII).





Abubilla. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (27-V); derecha hembra (13-VII).



Abubilla. Juvenil. Diseño de la cabeza: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).





Abubilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (27-V); derecha hembra (13-VII).





Abubilla. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).





Abubilla. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (27-V); derecha hembra (13-VII).





Abubilla. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).

286 **Abubilla**







Abubilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (27-V); derecha hembra (13-VII).







Abubilla. Desgaste y diseño de la pluma más externa de la cola: arriba izquierda adulto (18-VII); arriba derecha 2º año (18-VII); izquierda juvenil (04-VIII).





Abubilla. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).



Abubilla. Adulto: diseño del ala (13-VII).









Abubilla. Juvenil: diseño del ala (04-VIII)



Abubilla. Forma de la punta de la 9ª primaria: arriba izquierda adulto (07-VI); arriba derecha 2º año (18-VII); izquierda juvenil (04-VIII).

